




**unisa**  
Universitas 'Aisyiyah  
Yogyakarta




# Deteksi Dini Komplikasi Masa Nifas OLEH : NURUL SOIMAH 2021





رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا  
رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَارزُقْنِي فَهْمًا

“Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman”






# **Deteksi Dini Komplikasi Masa Nifas**


**OLEH : NURUL SOIMAH**

**DASAR ASUHAN KEBIDANAN  
NIFAS 2020-2021**



# TUJUAN PEMBELAJARAN

Mampu mengetahui dan melakukan deteksi dini, tanda bahaya masa nifas



# Deteksi Dini Komplikasi Masa Nifas

## Perdarahan pervagina

Perdarahan pervagina postpartum atau post partum hemorargi atau PPH adalah **kehilangan darah sebanyak 500 cc atau lebih** dari traktus genetalia setelah melahirkan.

- Hemorargi post partum primer 24 jam PP.
- HPP sekunder < 24jam pp samapi 6 minggu masa post partum



# HPP Primer

## **Penyebab:**

- a. Uterus atonik (Atonia uteri)
- b. Retensio plasenta
- c. Retensio sisa plasenta(selaput ketuban)
- d. Trauma genetalia ( Ruptur spontan dan trauma persalinan).
- e. Koagulasi intravascular.
- f. Inversio uterus



# HPP Sekunder

## Penyebab:

1. Fragmen plasenta atau selaput ketuban tertahan.
2. Pelepasan jaringan mati akibat trauma pasca persalinan macet (dapat terjadi di serviks, vagina kandung kemih, rectum).
3. luka terbuka pada uterus (post sectio caesaria, ruptur uterus)
4. Haematoma vulva (krn infeksi bartolinitis, pembuluh darah labia pecah)



# Infeksi masa nifas


- Infeksi masa nifas atau sepsis puerperalis adalah infeksi pada traktus genitalia yang terjadi pada setiap saat antara awitan (mulai) ketuban pecah atau persalinan dan 42 hari pasca persalinan atau abortus





# Tanda dan gejala sepsis puerpuralis

- a. Demam.
- b. Nyeri pelviks
- c. Nyeri tekan di uterus.
- d. Lokhea berbau menyengat.
- e. Terjadi sub involusi uteri
- f. Pada laserasi jalan lahir terasa nyeri., bengkak dan mengeluarkan darah.




# Penyebab sepsis puerperalis

- a. Anemia/kurang gizi.
- b. Higiene yang buruk.
- c. Tekhnik aseptik yang buruk.
- d. Manipulasi pada jalan lahir saat persalinan.
- e. Jaringan mati pada jalan lahir akibat persalinan.
- f. Inersi tangan, instrumen pembalut on steril  
(**Bakteri endogen**)
- g. Ketuban pecah lama.
- h. Kelahiran melalui SC



- Laserasi vagina/serviks yang tidak di perbaiki.
- Infeksi PMS (**Bakteri eksogen**)
- Hemorragi post partum.
- Tidak imunisasi tetanus selama hamil.
- Diabetes mellitus




# JENIS BAKTERI PENYEBAB INFEKSI NIFAS

1. Streptokoccus.
2. Stafilococcus.
3. E. Coli.
4. Clostridium tetani.
5. Clostridium welchi.
6. Clamidia dan gonocokkus.




# Bendungan air susu ibu ("*caked*")

- a. 24-48 jam pertama sesudah terlihatnya sekresi lakteal,
- b. payudara mengalami distensi menjadi keras dan berbenjol-benjol (aliran darah vena abnormal, pembengkakan limfatik)
- c. rasa nyeri yang kuat pada payudara
- d. Adanya kenaikan suhu.
- e. Rubor, Color, dolor



## 2. Mastitis

- a. Inflamasi glandula mammae
- b. Gejala mastitis supuratif ditemukan setelah minggu ke 3-4 pp
- c. Bendungan yang mencolok biasanya mendahului inflamasi dengan keluhan menggigil
- d. kenaikan suhu tubuh.
- d. peningkatan frekuensi denyut nadi.
- e. Payudara menjadi keras kemerahan,




# *Gejala mastitis non-infeksius*

- 1) adanya “bercak panas”, atau area nyeri tekan mammae yang akut.
- 2) Teraba benjolan kecil yang keras didaerah nyeri tekan tekan.
- 3) Suhu tubuh Normal.



# Gejala mastitis infeksius

- 1) badan lemah,nyeri otot seperti flu
- 2) Adanya kenaikan suhu tubuh.
- 3) Terdapat area bendungan meluas pada payudara.
- 4) Terdapat tanda radang
- 6) >48 jam bendungan ASI tidak teratasi






# Puting lecet

## Penyebab

- 1. Tehnik menyusui salah
- 2. infeksi bakteri melalui tangan ibu atau pakaian yang kotor
- 3. Puting payudara tenggelam
- 4. lidah bayi pendek
- 5, cara menghentikan lactasi kurang tepat



# Endometritis

## Radang dinding endometrium,

- Penyebab

1. Bakteri


2. Pasca tindakan manual plasenta, sc, luka perineum

## Tanda/gejala

Demam, nyeri otot, nyeri tekan abdomen,


nadi meningkat, Nafas cepat,

Masa inkubasi 3hr sampai 1 mg pp




# Thrombopheblitis

- Infeksi yang terjadi pada area vena akibat masuknya mikroorganisma patogen melalui pembuluh besar vena yang terbuka pada saat persalinan.
- Vena yang rentan terjadi thrombopheblitis yaitu
  1. Vena dinding uterus daerah ligamentum latum(vena ovarika dektra sinistra karena langsung berhubungan dengan vena plasenta
  2. . Vena tungkai dan vena femoralis,poplitea ditandai dengan warna kemerahan dan oedema




# Faktor predisposisi

- Obesitas
- Paritar tinggi dan umur ibu
- Trauma lama pada vena akibat anastesi
- Anemia maternal
- Penyakit jantung
- Varicositis
- Endometritis




# GEJALA

Nyeri tekan permukaan ekstremitas kaki  
atau area tepi atas simpisis




# Infeksi perineum



- Oedema vulva
- Hematoma vulva
- Penyebab
  1. Ruptur perineum
  2. Penjahitan luka yang salah
  3. Manipulasi persalinan pada perineum kaku
  4. Alat yang on steril



Bengkak pada area vulva vagina  
Nyeri untuk duduk maupun jalan



# Gambar Organ Genitalia interna







**Vesico-  
vaginal  
fistula**


**Urethra**


**Vagina**



# Peritonitis


- Peritonitis adalah peradangan peritoneum, suatu lapisan endotelial tipis yang kaya akan vaskularisasi dan aliran limpa
- Peritonitis adalah inflamasi peritoneum - lapisan membrane serosa rongga abdomen dan meliputi visera.
- Terjadi secara **akut dan kronis**






# Gejala

1. Nyeri tekan pada palpasi, tidak terlalu jelas lokasinya (peritoneum visceral), makin lama makin jelas lokasinya (peritoneum parietal).
2. defans muscular



# Tanda-tanda peritonitis relatif


- Demam tinggi (Hypotermia pada pasien sepsis)
- Takikardi,
- Dehidrasi hingga menjadi hipotensi.
- Nyeri abdomen hebat dengan punctum maximum diarea tertentu
- Dinding abdomen teraba tegang karena iritasi peritoneum



# *Etiologi*

## 1. Infeksi bakteri

- Mikroorganisme penyakit gastrointestinal
- Appendixitis radang dan perforasi
- Tukak peptik (lambung / duodenum)
- Tukak thypoid
- Tukan disentri amuba / colitis
- Salpingitis
- Hepatitis (SBP) spontanous bacteria peritoneum




# lanjutan

- bakteri Coli, streptokokus alpha dan beta hemolitik, stapilokokus aurens, enterokokus dan **yang paling berbahaya adalah clostridium wechii.**


## **PENYEBAB EKTERNAL**

1. Operasi yang tidak steril
2. Trauma kecelakaan (ruptur limpa, ruptur hati,
3. cacing enterobius vermikularis tuba fallopi  
Terbentuk pula peritonitis granulomatosa.



- Secara hematogen sebagai komplikasi beberapa penyakit akut seperti
  - a. radang pernapasan bagian atas,
  - b. otitis media,
  - c. mastoiditis,
  - d. glomerulonefritis.

Penyebab utama adalah streptokokus atau pneumokokus






# PARAMETRITIS

- Parametritis adalah radang dari jaringan longgar di dalam ligamentum latum. Radang ini biasanya unilateler.

## ***Tanda dan gejala.***

- Suhu tinggi dengan demam tinggi.
- Nyeri unilateral tanpa gejala rangsangan peritoneum, seperti muntah

*Etiologi*



# *Etiologi*


Parametritis dapat terjadi:

1. Dari endometritis dengan 3 cara :

- Per continuitatum : endometritis → metritis → parametritis
- Lymphogen
- Haematogen : phlebitis → periphlebitis → parametritis.


2. Dari robekan serviks

3. Perforasi uterus ( sonde, kuret, IUD )





# CERVICITIS

- Pengertian  
Cervicitis ( endo cervicitis ) ialah radang pada selaput lendir canalis cervikalis.
- Karena epitel selaput canalis cervikalis hanya terdiri dari satu lapisan silindris muda terjadi infeksi.



# cervicitis




# CERVICITIS AKUTA

## a. Penyebab


Cervicitis Akuta diawali dari infeksi endoseviks seperti

1. gonorhea
2. infeksi post abortus dan post partum
3. Masuknya *streptococcus*, *stafilococcus*.



# Gejala


1. Cervis merah dan membengkak
2. Keluar cairan mukus purulen.



# Cervicitis Kronika


## a. Patofisiologi

- Penyakit ini dijumpai pada wanita yang pernah melahirkan atau abortus dengan perlukaan cerviks terinfeksi pada area endocerviks dan kelenjar,.....>infeksi menahun.



# Penyebab


1. Gonorrhoe
2. Tindakan intra uteri dilatasi.
3. Alat-alat atau obat kontrasepsi.
4. Robekan cerviks terutama yang menyebabkan extropin






# Gejala

- Flour albus purulen dari kanalis cervicalis, kadang berbau( inspeksi dan inspekulo)
- Erosi portio berwarna merah.
- Sekunder dapat terjadi kolpitis dan vulvitis.
- Pada cervicitis kronis kadang dapat dilihat bintik ovula nabothii disebabkan oleh retensi kelenjar cerviks karena canalis tertutup oleh atropi luka cerviks atau karena radang




# *Kehilangan Nafsu Makan Dalam Waktu Yang Lama*

- Kelelahan dimasa persalinan
- adaptasi psikologis kehadiran anak
- Nutrisi rehidrasi cairan dan kalori pasca salin belum terpenuhi,



*Perasaan dan sedih dan kehilangan atau tidak mampu  
mengasuh sendiri bayinya dan dirinya sendiri*

- Dialami kebanyakan wanita hamil dan melahirkan
- Rasa nyeri pada awal masa nifas
- Kelelahan akibat kurang tidur selama persalinan dan setelah melahirkan
- Kecemasan akan kemampuannya untuk merawat bayinya setelah meninggalkan rumah sakit
- Ketakutan akan menjadi tidak menarik lagi



# Eklamsia dan pre eklamsia

- **Tanda dan gejala (pseudo)**

1. Sakit Kepala,

2. Nyeri Epigastrik,


3. Penglihatan Kabur

4. Pembengkakan Wajah dan Ekstremitas

## **Pasti**


1. Tekanan darah yang tinggi

( $>140/100$ mmhg).




# eklamsia

- Tekanan darah tinggi
- Kejang.



# Pustaka

- Marmi.2010, Asuhan Kebidanan ibu masa nifas, Pustaka pelajar, Yogyakarta
- Sinclair, 2010. Ilmu Kebidanan, EGC, Jakarta
- Sarwono Prawirohardjo, 2010. Ilmu Kandungan, Yayasan Bina Pustaka, jakarta




# DOA SESUDAH BELAJAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا  
وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami  
dapat mengikutinya Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan  
sehingga kami dapat menjauhinya





*Wassalamu'alaikum Wa rahmatullahi*  
SLIDE 3  
*Wabarakaatuh*







**UNISA**

Universitas 'Aisyiyah  
Yogyakarta

