



FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS AISYIAH YOGYAKARTA

NAMA	Rizfi Pramesi Lalita Fasya
NIM	2110101065
KELAS/KELOMPOK	A5
JUDUL PRAKTIKUM	Pemeriksaan urine HCG

ALAT HCG cassette dan Pipet tetes

BAHAN Urine

DASAR TEORI Keberadaan hormon hCG dianggap sebagai penanda kehamilan, sebab hormon ini diproduksi oleh sel embrio yang kemudian dilanjutkan prosesnya oleh plasenta, kurang lebih sekitar seminggu setelah terjadinya pembuahan. Hormon hCG sendiri berperan menstimulasi ovarium untuk menghasilkan hormon steroid agar kondisi kandungan senantiasa stabil. Mengingat hormon ini terdapat dalam jumlah besar di tubuh setiap ibu hamil, keberadaannya tak hanya terdeteksi pada aliran darah, tetapi juga pada cairan urine.

BAGAN ALUR CARA KERJA

- Siapkan HCG cassette dan letakkan di tempat yang bersih dan datar
- Masukkan 3 tetes urine ke dalam sumuran, jangan sampai terbentuk gelembung udara
- Tunggu hasilnya muncul hingga 3-4 menit
- Hasil positif ditunjukkan dengan adanya 2 garis merah yang muncul pada cassette
- Catat macam dan fungsi reagen yang digunakan dalam tes tersebut

hasil name? s

Yogyakarta, 14 Desember 2021
Menyetujui
Dosen Pengampu Praktikum

(Rosmita Nuzuliana, M. Keb)



FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA

NAMA Rizfi Pramesi Lalita Fasya
NIM 2110101065
KELAS/KELOMPOK A5

JUDUL PRAKTIKUM Pemeriksaan pH Urine
ALAT Pot Urine, Tabung Reaksi, Rak Tabung, dan Kertas Laktus/Kertas Universal Indikator

BAHAN Urine Sewaktu

DASAR TEORI
Ginjal dan jantung adalah dua organ utama yang mengatur keseimbangan asam dalam tubuh. Jantung mengeluarkan karbondioksida. Sementara ginjal mengatur pengeluaran asam yang tidak mudah menguap yang dihasilkan oleh proses metabolisme normal dari jaringan-jaringan. Keasaman urin utamanya berkaitan dengan asam pospat, dengan hanya sedikit bagian yang dikontribusikan oleh asam-asam organik seperti asam pyruvic, asam lactic dan asam citric. Asam-asam ini dikeluarkan pada urin sebagai garam, sodium, potassium, kalsium dan ammonium. Ginjal mengatur pengeluaran berbagai *cations* untuk memelihara keseimbangan asam normal. Hal ini dilakukan melalui penyerapan kembali sejumlah ion sodium oleh tubulus dan seiring dengan pengeluaran tubular akan hydrogen dan ammonium dalam pertukaran. Urin makin bertambah meningkatkan asam karena jumlah sodium disimpan oleh peningkatan tubuh.

- BAGAN ALUR CARA KERJA
- a) Disiapkan alat dan bahan.
 - b) Diambil sebuah kertas universal indicator/ kertas lakmus, Kemudian dicelupkan kedalam urine sampai tanda batas yang ditentukan pada kertas.
 - c) Dibandingkan warna yang terbentuk dengan warna standart (Kertas Universal)
 - d) Diamati adanya perubahan warna yang terjadi pada kertas lakmus.
 - e) Dicatat Hasilnya.

Yogyakarta, 14 Desember 2021
Menyetujui
Dosen Pengampu Praktikum

(Rosmita Nuzuliana, M. Keb)



FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA

NAMA	Rizfi Pramesi Lalita Fasya
NIM	2110101065
KELAS/KELOMPOK	A5
JUDUL PRAKTIKUM	Pemeriksaan Protein Urine


- ALAT
- Tabung reaksi
 - Penjepit tabung reaksi
 - Rak tabung
 - Pipet tetes
 - Corong
 - Pipet volume
 - Lampu spiritus/Bunsen
 - Beker glass

BAHAN: Asam asetat 6% dan Urine patologis

DASAR TEORI

Protein adalah sumber asam amino yang mengandung unsur C,H,O dan N . Protein sangat penting sebagai sumber asam amino yang digunakan untuk memnbangun struktur tubuh. Selain itu protein juga bisa digunakan sebagai sumber energi bila terjadi defisiensi energi dari karbohidrat dan/atau lemak. Sifat-sifat protein beraneka ragam, dituangkan dalam berbagai sifatnya saat bereaksi dengan air, beberapa reagen dengan pemanasan serta beberapa perlakuan lainnya. Urin terdiri dari air dengan bahan terlarut berupa sisa metabolisme (seperti urea), garam terlarut, dan materi organik. Cairan dan materi pembentuk urin berasal dari darah atau cairan interstisial. Komposisi urin berubah sepanjang proses reabsorpsi. Biasanya, hanya sebagian kecil protein plasma disaring di glomerulus yang diserap oleh tubulus ginjal dan diekskresikan ke dalam urin. Normal ekskresi protein biasanya tidak melebihi 150 mg/24 jam atau 10 mg/dl urin. Lebih dari 10 mg/dl didefinisikan sebagai proteinuria. Adanya protein dalam urine disebut proteinuria.

Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan proteinuria adalah : penyakit ginjal (glomerulonefritis, nefropati karena diabetes, pielonefritis, nefrosis lipoid), demam, hipertensi, *multiple myeloma*, keracunan kehamilan (*pre-eklampsia, eklampsia*), infeksi saluran kemih (*urinary tract infection*). Proteinuria juga dapat dijumpai pada orang sehat setelah kerja jasmani, urine yang pekat atau stress karena emosi. Untuk mengetahui adanya protein di dalam urin dilakukan

	pemeriksaan. Prinsip dari pemeriksaan ini terjadi endapan urine jika direaksikan dengan asam sulfosalisila.
<p>BAGAN ALUR CARA KERJA</p> <p>Interpretasi :</p> <p>(-) : tidak ada keruh</p> <p>(+) : keruh ringan tanpa butiran</p> <p>(++) : keruh mudah dilihat dgn butiran</p> <p>(+++): urin jeler keruh dgn kepingan</p> <p>(++++): urin sangat keruh dengan gumpalan.</p>	<p>a) Isi urine normal pada tabung 1 dan urin patologis pada tabung 2 hingga dua per tiga tabung</p> <p>b) Kedua tabung di miringkan, panaskan bagian atas urin sampai mendidih</p> <p>c) Perhatikan apakah terjadi kekeruhan dibagian atas urin tersebut dengan cara membandingkan dengan urin bagian bawah.</p> <p>d) Jika urine dalam tabung tidak terjadi kekeruahn maka hasilnya negative</p> <p>e) Jika urin dalam dalam tabung terjadi kekeruhan maka tambahkan asam asetat 6% sebanyak 3-5 tetes.</p> <p>f) Panaskan lagi sampai mendidih, Jika urine kembali bening/kekeruahn menghilang maka hasilnya negatif. Jika kekeruahn urin tetap ada maka hasilnya positif.</p>
	<p>Yogyakarta, 14 Desember 2021</p> <p>Menyetujui</p> <p>Dosen Pengampu Praktikum</p>  <p>(Rosmita Nuzuliana, M. Keb)</p>



FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

NAMA	Rizfi Pramesi Lalita Fasya
NIM	2110101065
KELAS/KELOMPOK	A5
JUDUL PRAKTIKUM	Pemeriksaan Kejernihan Urine

ALAT Pot Urine, Tabung Reaksi, Rak Tabung, dan Pipet Pasteur.

BAHAN Urine sewaktu

DASAR TEORI Uji kejernihan urine sama seperti uji warna. Nyatakan keadaan urine dengan salah satu dari: jernih, agak keruh, atau sangat keruh. Perlu diperhatikan apakah urine yang dianalisis itu keruh pada saat dikeluarkan atau setelah dibiarkan beberapa lama. Tidak semua macam kekeruhan menunjukkan sifat abnormal. Urine yang normalpun akan keruh jika dibiarkan atau didinginkan, kekeruhan ringan itu disebut nubecula dan terjadi dari lendir, sel-sel epitel dan leukosit yang lambat laun mengendap.


Sebab-sebab urine menjadi keruh, yaitu :

1. Bila urine keruh sejak awal ditampung, kemungkinan adanya fosfat yang cukup banyak (dari konsumsi makanan), adanya bakteri, sel-sel epitel atau sel eritrosit dan leukosit, chylus yang berasal dari adanya butir-butir lemak atau adanya zat-zat koloidal lain.
2. Bila urine menjadi keruh setelah didiamkan, kemungkinan adanya nubecula, urat-urat amorf, fosfat-fosfat amorf, adanya bakteri yang bukan berasal dari dalam badan namun terdapat pada botol penampung.

BAGAN ALUR CARA KERJA

- a) Disiapkan alat dan bahan.
- b) Dimasukkan urin kedalam tabung reaksi kurang lebih 3/4 bagian tabung.
- c) Diamati dengan cahaya tembus dengan posisi tabung miring
- d) Dicatat hasilnya.

Yogyakarta, 14 Desember 2021
Menyetujui
Dosen Pengampu Praktikum


(Rosmita Nuzuliana, M. Keb)



FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA

NAMA Rizfi Pramesi Lalita Fasya
NIM 2110101065
KELAS/KELOMPOK A5
JUDUL PRAKTIKUM Pemeriksaan Glukosa Urine
(Urine Reduksi)

ALAT
- Tabung reaksi
- Penjepit tabung reaksi
- Rak tabung
- Pipet tetes
- Corong
- Pipet volume
- Lampu spiritus/Bunsen
- Beker glass

BAHAN 5 cc larutan benedict dan urine patologis

DASAR TEORI
Glukosa mempunyai sifat mereduksi. Ion cupri direduksi menjadi cupro dan mengendap dalam bentuk merah bata. Semua larutan sakar yang mempunyai gugusan aldehyd atau keton bebas akan memberikan reaksi positif. Na sitrat dan Na karbonat (basa yang tidak begitu kuat) berguna untuk mencegah pengendapan Cu^{++} . Sukrosa memberikan reaksi negative karena tidak mempunyai gugusan aktif (aldehyd/keton bebas). Reaksi benedict sensitive karena larutan sakar dalam jumlah sedikit menyebabkan perubahan warna dari seluruh larutan, sedikit menyebabkan perubahan warna dari seluruh larutan, hingga praktis lebih mudah mengenalnya. Hanya terlihat sedikit endapan pada dasar tabung. Uji benedict lebih peka karena benedict dapat dipakai untuk menafsir kadar glukosa secara kasar, karena dengan berbagai kadar glukosa memberikan warna yang berlainan.

BAGAN ALUR CARA KERJA
negatif (-) : tetap biru
positif (+) : hijau kekuningan
(++) : kuning keah
(++) - jingga
(++++) : merah bata
a) Masukkan larutan benedict ke dalam tabung reaksi sebanyak 5cc
b) Campurkan urin patologis 5 - 8 tetes ke dalam tabung yang telah berisi benedict
c) Panaskan tabung di atas spritus/Bunsen dan sambil dikocok perlahan sampai mendidih
d) Dinginkan dan amati terjadi perubahan warna atau tidak

Yogyakarta, 14 Desember 2021

Menyetujui
Dosen Pengampu Praktikum

(Rosmita Nuzuliana, M. Keb)