

Analisis Jurnal Individualized

Kelompok Praktikum A5

Lulu Husniatul Aisy 2010101061

Sulistyaning Nur Indahsari 2010101062

Hasil

Kesimpulan

Hasil kesimpulan penelitian dari jurnal dengan judul "Pain acceptance and personal control in pain relief in two maternity care models: a cross-national comparison of Belgium and the Netherlands" adalah pada nyeri saat persaliannya, penggunaan obat nyeri memiliki kemungkinan yang lebih kecil pada saat penerimaan dalam waktu yang bersamaan, terdapat perbedaan dalam negara besar dalam pemberian obat pereda nyeri pada saat proses persalihan, contohnya wanita yang ada di negara Belanda, mereka yang melakukan proses persalinan di rumah sakit dengan kelahiran normal, mereka 6 kali lebih kecil kemungkinannya untuk diberikan obat pereda nyeri dalam proses persalinan, sedangkan untuk wanita hamil yang ada di negara Belgia, mereka tidak dapat disimpulkan secara rinci mengenai penerimaan obat pereda nyeri persalinan dikarenakan berbeda hipotesis antara wanita hamil di negara Belanda dan Belgia. Di negara Belanda obat pereda rasa nyeri persalihan lebih rendah penggunaannya dibanding negara Belgia karena memiliki sikap positif kontrol dalam menerima nyeri persalinan. Namun di negara Belgia, penggunaan obat pereda nyeri yang diprediksi oleh sikap negatif terhadap nyeri persalinan itu sendiri



Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif.dengan selection of methode.

Responden dalam penelitian adalah:For Belgium this case need for 16 respodence of pregant women and for Netherland need 89 pregnant women.(untuk negara Belgia jumlah responden nya adalah 16 ibu hamil dan 89 ibu hamil untuk negara netherland.



Untuk negara belanda, penggunaan obat pereda nyeri terbilang cukup rendah dikarenakan mereka memiliki sikap positif terhadap nyeri persalinan dan mengalami kontrol dalam obat nyeri (Dutch women find that the use of pain medication is lowest if women have a positive attitude towards labour pain and experience control over the reception of pain medication).

Evidence based

Penggunaan obat pereda nyeri di negara Belgia lebih tinggi dan sangat sensitif terhadap sikap negatif nyeri persalinan (labour pain acceptance is decisive in the labour pain medication use of Belgian women).



Penerapan

Penerapan obat pereda nyeri di Indonesia sendiri biasanya menggunakan kompres air hangat dibagian tubuh yang terasa nyerinya, melakukan pijatan relaksasi misal dibagian punggung, tangan, dan kaki, melakukan teknik relaksasi seperti menarik napas dalam dan menghirup aromatherapy. Untuk obat yang dikonsumsi sendiri biasanya menggunakan Ibuprofen, Paracetamol, Opiumid dll.



Daftar Pustaka

Jurnal Nasional :

“Technique of pain reduction the normal labor process; systematic review”

<http://ejournal.ildikti10.id/index.php/endurance/article/view/2357>

