

WORKSHEETS (LEMBAR KERJA)
PRAKTIKUM

Mata Kuliah	: Farmakologi
Materi	: Jenis-Jenis Obat
Nama	: Wan Tazkya Aulia Silvia Ananda (2010101058)
Kelompok	: A5

NO	KOMPONEN	PEMBAHASAN
1.	Obat Bebas	<p>Nama Obat : Paracetamol tablet Gambar :</p>  <p>Kegunaan : Selain sebagai obat pereda nyeri atau analgesik, manfaat paracetamol lainnya adalah memiliki sifat antipiretik. Obat antipiretik adalah obat yang mampu menurunkan demam. Paracetamol diduga bisa meningkatkan suhu tubuh dengan cara memengaruhi hipotalamus di otak.</p> <p>Konten : Setiap tablet mengandung Paracetamol 500 mg</p> <p>Aturan Pakai : Obat dapat diminum sebelum atau sesudah makan</p>

Indikasi :

Obat ini digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, serta menurunkan demam.

Kontra Indikasi :

Parasetamol jangan diberikan kepada penderita hipersensitif/alergi terhadap Paracetamol. Penderita gangguan fungsi hati berat.

Nama Obat : caviplex syrup**Gambar :****Kegunaan :**

untuk membantu pertumbuhan tulang, menambah nafsu makan, menguatkan daya pikir dan memenuhi kebutuhan tubuh akan vitamin dan mineral. Kandungan yang terdapat pada Caviplex Syr antara lain: Vitamin A berfungsi menjaga kesehatan mata dan memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Konten :

Vitamin A, vitamin D, Vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, Nikotinamid, Ca pantotenat, Ca Laktat, Ca Gliserofosfat, asam glutamat

	<p>Aturan Pakai : Dikonsumsi bersamaan dengan makanan</p> <p>Indikasi : Pertumbuhan tulang dan gigi, menambah nafsu makan, mencegah defisiensi, menambah dan menguatkan daya pikir, kebutuhan tubuh meningkat, misalnya masa pertumbuhan anak, ibu hamil dan menyusui, manula</p> <p>Kontra Indikasi : hipersensitivitas</p>
2.	<p>Obat bebas terbatas</p> <p>Nama Obat : Dulcolax Tablet</p> <p>Gambar :</p>  <p>Kegunaan : Obat ini digunakan untuk mengatasi masalah sembelit/susah BAB/konstipasi. Selain itu obat ini juga digunakan sebagai salah satu persiapan prosedur terapi diagnostic, terapi sebelum dan sesudah operasi dan dalam kondisi untuk mempercepat defekasi. DULCOLAX TABLET bekerja dengan cara merangsang pergerakan pada usus besar dan membantu jalan keluar nya feses.</p>

Konten :

Bisacodyl 5 mg

Aturan Pakai :

Tablet dianjurkan untuk diminum pada malam hari (waktu kerja obat 6-12 jam) untuk mendapatkan buang air besar keesokan harinya.

Indikasi :

Untuk mengatasi masalah sembelit/ susah BAB/ konstipasi. Untuk persiapan prosedur terapi diagnostic, terapi sebelum dan sesudah operasi dan dalam kondisi untuk mempercepat defekasi.

Kontra Indikasi :

Obat ini tidak digunakan pada pasien ileus, obstruksi usus, yang baru mengalami pembedahan di bagian perut seperti usus bbuntu, penyakit radang usus akut, dan nyeri perut parah yang berhubungan dengan mual muntah. Obat ini juga dikontraindikasikan pada dehidrasi yang parah dan pasien yang diketahui hipersensitif terhadap Bisacodyl.

Nama Obat : Caladine Lotion**Gambar :**

	<p>Kegunaan : CALADINE LOTION digunakan untuk mengatasi gatal karena biang keringat, udara panas, gigitan serangga, dan juga dapat dijadikan sebagai anti-alergi, antiseptik, atau untuk penyejuk kulit.</p> <p>Konten : Calamine 5 %, Zinc oxide 10%, Diphendramine Hcl 2%.</p> <p>Aturan Pakai : Bersihkan bagian kulit yang gatal lalu oleskan 2-4 kali sehari, sebaiknya digunakan sehabis mandi pagi dan sore.</p> <p>Indikasi : Anti alergi, antiseptik, penyejuk kulit</p> <p>Kontra Indikasi : hipersensitif</p>
3.	<p>Obat keras</p> <p>Nama Obat : Amoksisilin Tablet</p> <p>Gambar :</p> 

Kegunaan :

Obat ini digunakan untuk infeksi yang disebabkan oleh strain-strain bakteri yang peka spt Staphylococcus bukan penghasil penisilinase, Streptococcus, E.Coli, H.Influenzae, Streptococcus Pneumoniae, Streptococcus Faecalis, P.mirabilia dan N.Gonorrhoeae (bukan penghasil penisilinase) pada penyakit infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran genitourinari, dan gonore.

Konten :

Amoxicillin 500 Mg

Aturan Pakai :

Sesudah Makan

Indikasi :

Informasi Obat Ini Hanya Untuk Kalangan Medis. Penyakit infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran genitourinari, dan gonore yang disebabkan organisme Gram positif & Gram Negatif yang peka terhadap Amoxicillin

Kontra Indikasi :

Hipersensitivitas atau riwayat reaksi alergi berat (misalnya anafilaksis, sindrom Stevens-Johnson) terhadap amoksisilin atau -laktam lainnya (misalnya penisilin, sefalosporin, karbapenem, monobaktam). Mononukleosis menular (dicurigai atau dikonfirmasi).

Nama Obat : Kotrimoksasol Tablet
Gambar :



Kegunaan :

Obat ini digunakan untuk menangani infeksi yang disebabkan oleh bakteri, seperti bronkitis, otitis media, dan infeksi saluran kemih. Selain itu, kotrimoksazol juga dapat digunakan untuk menangani dan mencegah Pneumocystis Carinii Pneumonia (PCP) pada pasien dengan daya tahan tubuh turun, seperti penderita HIV/AIDS. Obat ini bekerja dengan menghambat pembentukan DNA dan protein bakteri.

Konten :

Sulfametoksazol 400 mg, trimetroprim 80 mg

Aturan Pakai :
Sesudah Makan

Indikasi :

Informasi obat ini hanya untuk kalangan medis. Mencegah proses agregasi trombosit pada pasien infark miokard dan pasien angina tidak stabil, serta mencegah serangan serebral iskemik sesaat.

		<p>Kontra Indikasi : hipersensitif, gangguan hati dan ginjal, wanita hamil, menyusui</p>
4.	Obat herbal	<p>Nama Obat : Diapet Tablet Gambar :</p>  <p>Kegunaan : Diapet merupakan obat herbal yang mengandung ekstrak daun jambu biji, kunyit, buah mojokeling dan kulit buah delima yang dikemas dalam bentuk sediaan kapsul. Diapet digunakan untuk membantu mengurangi frekuensi buang air besar.</p> <p>Konten : Psidii Guajava Folium 240 mg, Curucumae Domestica Rhizoma 204 mg, Terminalia Cherbulae 64 mg, Punicae Granati Pericarpium 72 mg</p> <p>Aturan Pakai : Dikonsumsi sesudah makan</p> <p>Indikasi : Membantu mengurangi frekuensi buang air besar</p> <p>Kontra Indikasi : hipersensitif</p>

Nama Obat : Stimuno

Gambar :



Kegunaan :

Stimuno forte membantu merangsang tubuh memproduksi lebih banyak antibodi dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh agar daya tahan tubuh bekerja optimal.

Konten :

Tiap kapsul mengandung : Ekstrak tanaman Phyllanthus niruri 50 mg

Aturan Pakai :

Dikonsumsi setelah makan

Indikasi :

Membantu merangsang tubuh memproduksi lebih banyak anti bodi dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh agar daya tahan tubuh bekerja optimal.

Kontra Indikasi :

Pasien dengan kondisi sistem imun yang hiperreaktif, misalnya pada pasien dengan riwayat penyakit autoimun atau hipersensitivitas.

5.	Obat bentuk lain	<p>Nama Obat : Ventolin Nebulizer</p> <p>Gambar :</p>  <p>Kegunaan : obat ini di gunakan untuk mengobati penyakit pada saluran pernapasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif (PPOK). Ventolin mengandung zat aktif salbutamol yaitu obat sistem saluran nafas yang ter masuk agonis adrenoreseptor beta-2 selektif kerja pendek, obat ini bekerja dengan cara merangsang secara selektif reseptor beta-2 adrenergik terutama pada otot bronkus sehingga menyebabkan terjadinya bronkodilatasi karena otot bronkus mengalami relaksasi.</p> <p>Konten : Per ampul : Salbutamol sulfate 2.5 mg</p> <p>Aturan Pakai : Masukkan ke dalam nebulizer untuk dibuat menjadi partikel gas dan dihirup.</p> <p>Indikasi : Bronkospasme pada asma bronkial, bronkitis kronis & emfisema</p> <p>Kontra Indikasi : hipersensitif, alergi terhadap zat aktif</p>
----	-------------------------	--

Nama Obat : Miconazole salep
Gambar :



Kegunaan :

Krim ini digunakan secara topikal atau pada membran mukosa untuk mengobati infeksi yang disebabkan fungi Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum, Candida, dan Malessezia furfur. Miconazol bekerja menghambat biosintesis ergosterol pada jamur dan mengubah komposisi komponen lipid lain di dalam membran, sehingga mengakibatkan nekrosis sel jamur.

Konten :

Miconazole nitrate 2%

Aturan Pakai :

Dioleskan dengan keadaan bersih pada area kulit yang sakit atau terinfeksi.

Indikasi :

Obat ini digunakan untuk terapi Tinea Pedis (kaki atlet), Tinea Kruris & Tinea Korporis yang disebabkan oleh Trikhofiton Rubrum, Trikhofiton Mentagrofitis & Epidermofiton Flokosum, kandidiasis Kutaneus (Moniliasis) & Tinea Versikolor.

	<p>Kontra Indikasi : Hipersensitivitas dan bayi usia kurang dari 4 bulan.</p>
--	--