



OBAT DALAM MASA KEHAMILAN (TABLET TAMBAH DARAH & PENGUAT KANDUNGAN)

KELOMPOK 2 :

Nirmala Ayu Arifah	(2010101068)
Gevy Nuradira Isnaini	(2010101069)
Aisya Novia Rahmi	(2010101070)
Shinta Septya Amanda	(2010101071)

Tablet Tambah Darah

1. Sangobion

- ❖ Jenis obat : Obat paten
- ❖ Kategori obat : Obat bebas
- ❖ Aturan pakai obat makan : Dikonsumsi pada waktu makan atau sesudah makan
- ❖ Kegunaan : Suplemen penambah darah
- ❖ Cara penggunaan : Diminum 1 kali per hari.
- ❖ Dosis : 1 kapsul per hari.
- ❖ Efek samping : Gangguan gastro intestinal atau saluran pencernaan dan tinja berwarna gelap.
- ❖ Kategori aman untuk kehamilan : Kategori B



2. Fermia

- ❖ Jenis obat : obat paten
- ❖ Kategori obat : obat bebas
- ❖ Aturan pakai obat : dikonsumsi setelah makan
- ❖ Kegunaan : digunakan untuk memenuhi kebutuhan zat besi, vitamin B6, dan asam folat. Suplemen ini juga dapat membantu mencegah anemia.
- ❖ Cara penggunaan : diminum setelah makan
- ❖ Dosis : 1 kapsul sekali sehari
- ❖ Efek samping : belum ada efek samping yang dilaporkan.
- ❖ Kategori aman untuk kehamilan : kategori N atau belum dikategorikan




3. Nature Plus

- ❖ Jenis obat : obat paten
- ❖ Kategori obat : obat bebas
- ❖ Aturan pakai obat : dikonsumsi sesudah makan
- ❖ Kegunaan : suplemen penambah darah/meningkatkan aliran darah
- ❖ Cara penggunaan : diminum 1 kali per hari.
- ❖ Dosis : 1 tablet diminum 1 kali sehari
- ❖ Efek samping : belum ada efek samping yang dilaporkan. Jika terjadi efek samping yang tidak diinginkan, hentikan penggunaan dan segera hubungi dokter.
- ❖ Kategori aman untuk kehamilan : kategori N atau belum dikategorikan



4. Hemobion

- ❖ Jenis Obat : Obat paten
- ❖ Kategori Obat : Obat bebas
- ❖ Aturan Pakai Obat : Dikonsumsi sesudah makan
- ❖ Kegunaan : Mengatasi anemia pada kehamilan dan laktasi
- ❖ Cara penggunaan : Diminum 1x per hari
- ❖ Dosis : 1 Kapsul per hari.
- ❖ Efek samping : Hilangnya nafsu makan, pusing, mual, muntah, konstipasi, sakit kepala, BAB berwarna hitam
- ❖ Kategori aman untuk kehamilan : Kategori B



5. Blackmores Bio Iron Advance

- ❖ Jenis obat : obat paten
- ❖ Kategori obat : obat bebas
- ❖ Aturan pakai obat : dikonsumsi sesudah makan
- ❖ Kegunaan : membantu meningkatkan energi dan vitalitas yang sehat bila kadar zat besi rendah.
- ❖ Cara penggunaan : diminum setelah makan
- ❖ Dosis : 1 tablet sehari setelah makan, atau sesuai petunjuk dokter.
- ❖ Efek samping : belum ada efek samping yang dilaporkan
- ❖ Kategori aman untuk kehamilan : kategori N atau belum dikategorikan



6. Ferofort

- ❖ Jenis obat : obat paten
- ❖ Kategori obat : obat bebas
- ❖ Aturan pakai obat : dikonsumsi bersamaan atau setelah makan
- ❖ Kegunaan : mengobati anemia akibat defisiensi zat besi
- ❖ Cara penggunaan : di minum 1-2 kaplet sehari.
- ❖ Dosis : 1-2 kaplet per hari
- ❖ Efek samping : mual, muntah, nyeri ulu hati, sembelit, dan diare
- ❖ Kategori aman untuk kehamilan : kategori A




Penguat Kandungan

1. Duphaston Dydrogesterone

- ❖ Jenis obat : obat paten
- ❖ Kategori obat : obat keras
- ❖ Aturan pakai obat : dikonsumsi sesudah makan
- ❖ Kegunaan : digunakan dalam kasus infertilitas, terancam keguguran, keguguran berulang, nyeri saat haid, peradangan pada rahim/endometriosis, siklus haid tidak teratur dan amenorea.
- ❖ Cara penggunaan : diminum sesuai dosis yang dianjurkan dokter



- 
- ❖ Dosis : Perdarahan uterus abnormal: 1 tablet diminum dua kali sehari selama 5-7 hari, dikombinasikan dengan estrogen. Untuk mencegah perdarahan lebih lanjut, 1 tablet diminum sekali sehari pada hari ke 11-25 siklus menstruasi. Infertilitas akibat insufisiensi luteal: 1 tablet diminum dua kali sehari pada hari ke 14-25 siklus menstruasi. Kemudian berlanjut untuk setidaknya enam siklus berturut-turut.
 - ❖ Efek samping : Pendarahan, perubahan menstruasi, edema (bengkak), perubahan berat badan, mual, muntah, sakit perut, diare, sakit kepala
 - ❖ Kategori aman untuk kehamilan : kategori B

2. Premaston

- ❖ Jenis obat : obat paten
- ❖ Kategori obat : obat keras
- ❖ Aturan pakai obat : diberikaan bersama makanan jika timbul gangguan pada pencernaan
- ❖ Kegunaan : penguat kandungan bagi ibu hamil untuk mencegah keguguran
- ❖ Cara penggunaan : diminum sesuai dengan petunjuk dokter
- ❖ Dosis : Persalinan yang terancam prematur : maksimal 40 mg / hari. Abortus mengancam : 3 x sehari 5 mg selama 5-7 hari
- ❖ Efek samping : mual dan muntah
- ❖ Kategori aman untuk kehamilan : kategori N atau belum dikategorikan



3. Utrogestan

- ❖ Jenis obat : obat paten
- ❖ Kategori obat : Obat keras
- ❖ Aturan pakai obat : Sebaiknya diberikan pada saat perut kosong. Telan dengan segelas air diluar waktu makan. Sebaiknya diberikan menjelang tidur.
- ❖ Kegunaan : sebagai obat penguat kandungan, mengatasi masalah menstruasi, pendarahan, dan terapi gejala menopause
- ❖ Cara penggunaan : sesuai dengan resep dokter
- ❖ Dosis : 200-300 mg per hari dalam 1 atau 2 dosis terbagi. Dapat ditingkatkan hingga 600 mg per hari dalam 3 dosis terbagi
- ❖ Efek samping : Perubahan siklus menstruasi, amenore, perdarahan intermenstruasi, sakit kepala.
- ❖ Kategori aman untuk kehamilan : Kategori B





TERIMA KASIH