

OBAT DALAM MASA KONTRASEPSI

NAMA ANGGOTA

Nirmala Ayu Arifah (068)
Gevy Nuradira Isnaini (069)
Aisya Novia Rahmi (070)
Shinta Septia Amanda (071)

PIL KOMBINASI (ETHINYLESTRADIOL + LEVONOGESTREL)

Nama Obat	: Pil KB Andalan Laktasi
Jenis obat	: Generik
Kategori obat	: Obat keras
Aturan pakai	: Sebelum memakan obat ini perlu di konsultasikan dahulu dengan dokter
Kegunaan obat	: kontrasepsi oral dosis rendah untuk ibu menyusui.
Cara penggunaan	: hanya bisa didapatkan dan digunakan berdasarkan resep dokter.
Dosis Obat	: 1 tablet setiap hari pada jam yang sama. Diberikan sesudah makan. Dapat segera diminum setelah masa nifas selesai...
Efek samping	: gangguan pencernaan, perubahan nafsu makan, retensi cairan, ruam, depresi menyal, nyeri payudara, migrain, perubahan siklus menstruasi



PIL KOMBINASI (ETHINYLESTRADIOL + LEVONOGESTREL)

Nama Obat	: Trinordiol 28
Jenis obat	: Generik
Kategori obat	: Obat keras
Aturan pakai	: Dianjurkan minum setiap hari pada saat yang sama.
Kegunaan obat	: Pencegah kehamilan
Cara penggunaan	: Tablet pertama diminum pada hari pertama siklus menstruasi.
Dosis Obat	: 1 tablet sehari untuk 28 hari berurutan dalam 1 kemasan..
Efek samping	: Tromboflebitis atau kelainan tromboembolik. Penyakit pembuluh darah serebral atau pembuluh darah koroner. Kelainan fungsi hati yang nyata. Diketahui atau diduga adanya kanker buah dada atau alat-alat genital. Diketahui atau diduga adanya neoplasia yang tergantung estrogen. Perdarahan genital abnormal yang tak terdiagnosa. Diketahui atau diduga adanya kehamilan



PIL KOMBINASI (ETHINYLESTRADIOL + LEVONOGESTREL)

Nama Obat	: Mileva
Jenis obat	: Paten
Kategori obat	: Obat keras
Aturan pakai	: Dikonsumsi pada waktu yang sama setiap hari, dengan interval tidak lebih dari 24 jam selama 21 hari berturut-turut, dimulai pada hari pertama menstruasi, diikuti 7 hari bebas tab. .
Kegunaan obat	: pencegah kehamilan
Cara penggunaan	: Dikonsumsi sehari satu kali
Dosis Obat	: 1 tab setiap hari
Efek samping	: mengantuk, pusing, gangguan penglihatan, gangguan pernapasan, jantung berdebar, dan lain-lain

PIL KOMBINASI (ETHINYLESTRADIOL + LEVONOGESTREL)

Nama Obat	: Clclogynon
Jenis obat	: Paten
Kategori obat	: Obat keras
Aturan pakai	: diminum setelah makan
Kegunaan obat	: Kontrasepsi oral dan pencegah kehamilan
Cara penggunaan	: oral
Dosis Obat	: 1 tablet obat selama 21 hari terhitung hari pertama pengguna mengalami menstruasi, dilanjutkan dengan mengonsumsi 1 table placebo selama 7 hari setelahnya.
Efek samping	: infark miokard, hipertensi, mual dan muntah, sirosis hati, kram perut, migrain, ruam kulit, gangguan ginjal, berjerawat



PIL KOMBINASI (ETHINYLESTRADIOL + LEVONOGESTREL)

Nama Obat	: Sydnaginon
Jenis obat	: Paten
Kategori obat	: Obat keras
Aturan pakai	: Dapat diberikan bersama atau tanpa makanan
Kegunaan obat	: pencegahan kehamilan
Cara penggunaan	: Setelah makan
Dosis Obat	: 1 tablet plasebo/hari pada hari pertama siklus menstruasi, lalu dilanjutkan dengan tablet aktif di sepanjang siklus..
Efek samping	: menstruasi tidak teratur, peningkatan resiko kanker payudara, perubahan libido, gangguan endokrin, mual dan muntah, sakit kepala



PIL KOMBINASI (ETHINYLESTRADIOL + LEVONOGESTREL)

Nama Obat	: Planotab
Jenis obat	: Paten
Kategori obat	: Obat keras
Aturan pakai	: Dapat diberikan bersama makanan
Kegunaan obat	: kontrasepsi oral untuk pencegah kehamilan
Cara penggunaan	: dikonsumsi bersama makan
Dosis Obat	: Obat di minum mulai dari yang berukuran kecil sejak hari pertama haid hingga 21 hari ke depan, kemudian di lanjutkan dengan pil yang berukuran lebih besar selama 7 hari. Obat di minum pada jam yang sama setiap harinya...
Efek samping	: sakit kepala, depresi, gangguan nafsu makan, perubahan libido, rambut rontok, kerusakan hati, perubahan genitourinari



PIL KOMBINASI (ETHINYLESTRADIOL + LEVONOGESTREL)

Nama Obat	: Mikrodinol 30 KB lingkaran emas
Jenis obat	: Paten
Kategori obat	: Obat keras
Aturan pakai	: sebelum atau sesudah makanan
Kegunaan obat	: kontrasepsi oral untuk pencegah kehamilan
Cara penggunaan	: Diberikan sebelum atau sesudah makan
Dosis Obat	: 1 tablet per hari.
Efek samping	: sakit kepala, menstruasi tidak teratur, gangguan nafsu makan, perubahan libido, rambut rontok, mual muntah



PIL KOMBINASI (ETHINYLESTRADIOL + LEVONOGESTREL)

Nama Obat	: Novadiol 28
Jenis obat	: Paten
Kategori obat	: Obat keras
Aturan pakai	: Harus menggunakan resep dokter
Kegunaan obat	: Kontrasepsi hormonal dan pencegah kehamilan
Cara penggunaan	: oral
Dosis Obat	: 2 tablet sekaligus secepat mungkin, sebaiknya dalam 12 jam namun tidak boleh lebih dari 72 jam setelah intercourse.
Efek samping	: Jerawat, amenore, pusing, nyeri payudara, mual, perdarahan tidak teratur



LINESTRENOL

- Nama Obat : Andalan Laktasi
- Jenis obat : generik
- Kategori obat : Obat keras
- Aturan pakai : Untuk efektivitas penuh, pil dapat diminum pada hari pertama haid dan setiap hari seterusnya pada jam yang sama
- Kegunaan obat : Kontrasepsi oral
- Cara penggunaan : oral
- Dosis Obat : 1x1 tablet
- Efek samping : spotting pada 3 bulan pertama, pusing, mual, payudara terasa lebih lembek.



ETHINYLESTRADIOL + DROSPIRENONE



- Nama Obat : Yasmin
- Jenis obat : Paten
- Kategori obat : Obat keras
- Aturan pakai : Dikonsumsi dengan atau tanpa makanan. Konsumsi dengan waktu yang sama
- Kegunaan obat : Kontrasepsi oral dan mengatasi retensi cairan terkait hormon
- Cara penggunaan : Kontrasepsi oral
- Dosis Obat : Mulai pada hari pertama menstruasi, tiap hari 1 tablet selama 21 hari, lalu 7 hari tanpa tablet, dan seterusnya
- Efek samping : Emosi labil, depresi/mood depresif, penurunan, hilangnya libido, migrain, mual, nyeri payudara, perdarahan uterus yang tidak terjadwal, perdarahan saluran genital yang tidak dijelaskan lebih lanjut, mual, eritema.

ETHINYLESTRADIOL + DROSPIRENONE



- Nama Obat : YAZ
- Jenis obat : Paten
- Kategori obat : Obat keras
- Aturan pakai : Berikan bersama makanan
- Kegunaan obat : Kontrasepsi oral dan mencegah kehamilan
- Cara penggunaan : Kontrasepsi oral
- Dewasa:
Ethinylestradiol 0.02 mg dan drospirenone 3 mg
Ethinylestradiol 0.03 mg dan drospirenone 3 mg
- Dosis Obat : Dosis 1 tablet sekali sehari dari paket, sesuai petunjuk. Dosis harus diminum pada waktu yang sama setiap hari.
- Efek samping : Mual, Depresi, Nyeri punggung, Diare, Kelainan kandung empedu serta nyeri atau pembengkakan payudara.

ETHINYLESTRADIOL + DROSPIRENONE

Nama Obat	: Synfonia 24
Jenis obat	: Paten
Kategori obat	: Obat keras
Aturan pakai	: Berikan bersama makanan
Kegunaan obat	: untuk mencegah kehamilan
Cara penggunaan	: Setelah makan
Dosis Obat	: 1 x sehari selama 28 hari, sesuai dengan petunjuk hari pada blister.
Efek samping	: Emosi labil, sakit kepala, mual, nyeri payudara, metroragia, amenore



ETHINYLESTRADIOL + DESOGESTRE

Nama Obat	: Mercilon 28
Jenis obat	: Paten
Kategori obat	: Obat resep
Aturan pakai	: Berikan bersama makanan atau tidak
Kegunaan obat	: Digunakan dalam perawatan, kontrol, pencegahan kehamilan
Cara penggunaan	: Bersamaan makan
Dosis Obat	: 1 tablet sehari tanpa terputus dimuali pada hari pertama siklus haid lalu 7 tablet plasebo.
Efek samping	: Gangguan GI, ikterus kolestatik, trombosis, peningkatan TD kloasma, eritema nodosum ruam, sakit kepala, migren



ETHINYLESTRADIOL + DESOGESTRE

Nama Obat	: Mervelon 28
Jenis obat	: Paten
Kategori obat	: Obat keras
Aturan pakai	: Berikan bersama makanan
Kegunaan obat	: Kontrasepsi oral
Cara penggunaan	: Bersamaan makan
Dosis Obat	: 1 x 1 tablet
Efek samping	: Mual, muntah, nyeri abdomen, sakit kepala, dan nyeri payudara



The background is a light orange color with several white daisy flowers and green leaves scattered around. The daisies have yellow centers and white petals. The leaves are simple shapes with thin black veins. There are also a few small white dots scattered across the background.

TERIMA KASIH