


PENGENALAN OBAT
PENYAKIT INFEKSI
DAN
OBAT PENYAKIT GENERATIF



KELOMPOK 1

Ratika Juliansi 2010101064

Veny Atsila Salasa Bila 2010101065

Elvitrah Nur Vinski 2010101066

Alifah Qois Fatunisa 2010101067





A. INFEKSI SALURAN KEMIH



Metronidazole

Jenis obat : generic

Kategori Obat : Antibiotik

Aturan Pakai : harus dengan resep dokter

Kegunaan Obat : menangani infeksi akibat bakteri atau parasite di system reproduksi, saluran pencernaan, kulit, jantung, tulang dan sendi

Cara penggunaan : berikan setelah makan

Dosis : dewasa dan anak-anak di atas 10 tahun : 1 g setiap 8 jam, selama 3 hari

Efek samping : berikut adalah efek samping yang dapat terjadi akibat penggunaan Metronidazole

- Pusing
- Sakit kepala
- Mual
- Muntah
- Diare
- Sembelit
- Rasa pahit di mulut

Kategori aman untuk kehamilan dan menyusui : kategori C

B. INFEKSI JAMUR

Clotrimazole

Jenis obat : generic

Kategori obat : anti jamur golongan azole

Aturan pakai : harus dengan resep dokter

Kegunaan obat : studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin

Cara penggunaan : dioleskan pada kulit

Dosis : oleskan krim dengan kandungan clotrimazole 1% sebanyak 2-3 kali sehari selama 2-4 minggu

Efek samping : -sensasi terbakar

- kulit berubah menjadi kemerahan

-kulit mengelupas


Kategori aman untuk kehamilan dan menyusui : kategori B

C. TOXOPLASMOSIS

Spiramisin



- + Jenis obat : obat generic
- Kategori obat : antibiotic macrolid
- Aturan pakai : harus dengan resep dokter
- Kegunaan obat : SPIRAMYCIN merupakan antibiotik golongan makrolida yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Juga untuk mengatasi toksoplasmosis pada ibu hamil
- Cara penggunaan : berikan sebelum makan
- Dosis : Dewasa 1 tablet 3 kali sehari selama 5 hari
- Anak : 50-100 mg/kgBb/hari terbagi dalam 2-3 dosis selama 5 hari
- Efek samping reaksi alergi pada kulit
- + Katerogir aman untuk kehamilan dan menyusui : kategori C



LANJUTAN

Pyrimethamine

Jenis obat : Obat generic

Kategori obat : obat keras

Aturan pakai : ikuti anjuran dokter dan baca informasi yang terdapat pada kemasan

Kegunaan obat : untuk menangani penyakit toksoplasmosis dan sistosisporiasis

Cara penggunaan : harus dikonsumsi setelah makan


Dosis : Dewasa 25 mg, 1 kali seminggu

Anak usia <4 tahun 6,25 mg, 1 kali seminggu

Anak usia 4-10 tahun 12,5 mg, 1 kali seminggu

Efek samping : sakit katarak, rasa nyeri tak terduga, reaksi pada kulit, seperti iritasi, ruam, atau sulit bernapas

Kategori aman untuk kehamilan dan menyusui : kategori C



D. INFEKSI STREPTOCOCCUS

Penisilin

Jenis obat : generic

Kategori obat : antibiotic

Aturan pakai : dapat dikonsumsi setelah makan

Kegunaan obat : mengatasi infeksi bakteri

Cara penggunaan obat : di anjurkan setiap 6-8 jam setelah makan

Dosis obat : dewasa 125-5—mg

Anak-anak usia 1 bulan sampai 12 tahun 25-75mg/kgBB per hari

Efek samping

- Diare
- Mual
- Sakit perut
- Sakit kepala
- sariawan

E. RUBELLA

Paracetamol

Jenis obat : generic

Kategori obat : obat bebas

Aturan pakai : obat diminum sebelum atau sesudah makan

Kegunaan obat : untuk meredakan demam dan nyeri

Cara penggunaan obat : ikuti anjuran dokter dan membaca informasi yang terdapat pada kemasan

Dosis obat :

dewasa 500-1000 mg atau 10-15 mg/kgBB, setiap 4-6 jam

Bayi dan anak: 10-15 mg/kgBB setiap 4-6 jam

Efek samping

- Sakit kepala
- Mual dan muntah
- Perut bagian atas terasa sakit

Kategori untuk kehamilan dan menyusui : kategori C



IBUPROFEN +

LANJUTAN +

Jenis obat : obat generik

Kategori obat : obat bebas dan obat resep +

Aturan pakai obat : diminum setelah makan +

Kegunaan obat ; meredakan nyeri, demam dan radang sendi

Cara penggunaan obat L ikuti anjuran dokter dan bacalah aturan pakai yang terdapat pada kemasan +

Dosis obat ; dewasa dan anak-anak > 12 tahun : 200-400 mg tiap 4-6 jam sekali sesuai kebutuhan

Efek samping obat

- Perut kembung
- Sakit maag
- Sakit kepala
- Diare atau sembelit

Kategori untuk kehamilan dan menyusui : kategori C



THANKYOU